

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-6-84379482

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 34
du 12 juin 1984.

V I G N E

- Premières sorties de vers de la grappe.
- Mildiou sur grappes.
- Eclosions de Cicadelles de la Flavescence dorée.

Les premières fleurs peuvent être observées sur GRENACHE, mais pour la plupart des cépages, la floraison n'a pas encore débuté.

* TORDEUSES DE LA GRAPPE.

Les premiers glomérules ont été dénombrés la semaine dernière à AGHIONE, PIANICCIA, CAMPO-QUERCIO et GHISONACCIA. Le seuil de 100 glomérules pour 100 grappes n'a jamais été observé. Inutile donc de traiter, sauf situations exceptionnelles.

* MILDIOU.

Dans de nombreuses parcelles mal protégées; on peut voir des taches sur feuilles et des dégâts sur grappes qui sont souvent importants. Les grappes sont très réceptives à cette maladie pendant la floraison. La vigne doit impérativement être protégée pendant cette période. Ne négligez pas ce traitement avant floraison ! Renouvelez le 1er traitement conseillé dans le Bulletin du 30 mai. Vu les conditions climatiques très instables, choisissez de préférence un produit systémique (Acylon super F, Vamin, Caltan, Caltan C).

Réalisez un traitement soigné, en passant dans tous les rangs.

* OIDIUM.

Prévoyez un poudrage en pleine floraison.

* CICADELLES de la FLAVESCENCE DORÉE.


Cette cicadelle "*Scaphoideus Littoralis*" transmet la flavescence dorée, bien connue déjà en MARANA-CASINCA et PATRIMONIO. De nouveaux foyers ont été observés en 1983 à GHISONACCIA, VADINA et dans la Plaine de PERI à AJACCIO.



Cochylis : larve

Les sorties des premières larves sont observées depuis quelques jours et un traitement insecticide visant à détruire les jeunes larves devra être réalisé dans la semaine du 18 au 24 juin, dans toutes ces zones.

Les produits insecticides destinés à lutter contre les vers de la grappe peuvent être utilisés.



* Feuilles décolorées sur le pourtour ou marquées de taches jaunes ou dans lesquelles seules les nervures restent vertes ..., de nombreux cas sont visibles actuellement.

Ce type d'accident est lié à l'utilisation de désherbants. Il est favorisé par des précipitations particulièrement abondantes. Seules, les plus vieilles feuilles sont touchées.

ARBRES FRUITIERS

Renouveler les traitements contre la *Cloque* et le *Corynéum*.

AGRUMES

Les premiers foyers de pucerons noirs et verts des **agrumes** commencent à se manifester dans de nombreux vergers. Prévoir un traitement spécifique entre le 15 et le 20 juin, dans les vergers les plus touchés.